

Lacrimart®
0,01% + 0,15% COLLIRIO
BENZALCONIO CLORURO E METILCELLULOSA

PRIMA DELL'USO LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO. Questo è un medicinale di automedicazione che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del Medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al Farmacista.
- Consultate il Medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

Composizione

100 ml di soluzione contengono: **Principi attivi:** Benzalconio Cloruro 0,01 g, Metilcellulosa 0,15 g. **Eccipienti:** Sodio Cloruro; Potassio Cloruro; Acido Etilendiaminotetracetico; acqua per preparazioni iniettabili.

Come si presenta

Lacrimart è un collirio e si presenta in un flacone da 10 ml.

Che cosa è

Lacrimart è un prodotto oftalmologico disinfettante, lubrificante per uso oftalmico.

Titolare A.I.C.

BAIF International Products New York S.n.c. - Via XX Settembre, 20/68 - Genova

Produttore e controllore finale

Bruschettini S.r.l. - Genova

Perché si usa

Disinfezione della mucosa oculare. Lubrificante e umettante dell'occhio nei casi di insufficiente secrezione lacrimale (Sindrome dell'occhio secco).

Quando non deve essere usato

Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. Per la presenza di Benzalconio Cloruro, non utilizzare Lacrimart durante l'applicazione di lenti a contatto morbide, ma tra un indossaggio e l'altro.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Lacrimart può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Quali alimenti o medicinali possono modificare l'effetto del medicinale

Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro Medico o Farmacista.

È importante sapere che

Lacrimart non interferisce sulla capacità di guida né sull'uso di macchine.

Come usare questo medicinale

Attenzione: non superare le dosi consigliate.

Instillare 1-2 gocce nel sacco congiuntivale 3-4 volte al dì. Mantenere l'occhio aperto e tramite leggera pressione sul corpo del flacone, instillare una goccia nel sacco congiuntivale. L'uso se prolungato, di prodotti per uso topico può dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il Medico per istituire una terapia idonea.

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale

In caso di ingestione accidentale di Lacrimart, avvertite immediatamente il Medico.

Effetti indesiderati

È possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione) per altro priva di conseguenze, che non comporta modifica del trattamento. Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è opportuno consultare il Medico o il Farmacista. È opportuno comunicare al Medico o al Farmacista la comparsa di qualsiasi effetto indesiderato non

descritto nel foglietto illustrativo. Richiedere la scheda di segnalazione degli effetti indesiderati disponibile in Farmacia (modello B).

Scadenza e conservazione

La data di scadenza riportata sull'etichetta si riferisce al prodotto in confezionamento integro correttamente conservato. Il prodotto non deve essere utilizzato oltre i 30 giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

È importante avere a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

Revisione del foglio illustrativo da parte del Ministero della Salute:

Dicembre 2005.

BAIF International Products New York S.n.c.

Via XX Settembre, 20-68 - Genova

Agenzia Italiana del Farmaco