FOGLIO ILLUSTRATIVO

Lenirit® 0,5% Crema
(idrocortisone acetato)

DENOMINAZIONE DELLA SPECIALITA' MEDICINALE

LENIRIT 0,5% Crema (idrocortisone acetato)

COMPOSIZIONE

100 g di LENIRIT contengono:

Principio attivo:

Idrocortisone acetato 0.5 g

Eccipienti

Estere poliglicolico di acidi grassi C_{12}-C_{18}, gliceriIlmonodistearato autoemulsionante, squalano, cetile palmitato, metile p-idrossibenzoato, etile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, profumo, acqua depurata FU.

FORMA FARMACEUTICA E CONFEZIONI

Crema per uso dermatologico in tubetto di alluminio deformabile, rivestito interamente di araldite, da 20 g.

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

LENIRIT® è una crema dermatologica il cui principio attivo è l'idrocortisone acetato, noto farmaco dotato di attività antiinfiammatoria.

Il basso dosaggio unitamente agli eccipienti non irritanti e nello stesso tempo favorenti una buona veicolazione del prodotto, fanno di LENIRIT® un ottimo rimedio nel trattamento delle irritazioni minori della pelle come: pruriti, arrossamenti dovuti ad eczema, punture di insetti, dermatiti da contatto dovute a cosmetici, saponi e detersivi in genere.

TITOLARE AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

EG S.p.A. - Milano

CONCESSIONARIO DI VENDITA

ELYTRA PHARMA S.r.l., Via Egadi 7, 20144 Milano

OFFICINA FARMACEUTICA

DOPPEL Farmaceutici S.r.l.

Via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 – Cortemaggiore (Pc)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Punture di insetti, pruriti, eritemi o ustioni circoscritte, eczemi.

CONTROINDICAZIONI

Controindicata in caso di accertata ipersensibilità all'idrocortisone acetato, L'uso dell'idrocortisone è controindicato nel caso di affezioni virali, batteriche e fungine.

PRECAUZIONI D' IMPIEGO

Solo per uso esterno. La crema non trova impiego oftalmologico, ne va applicata nelle zone perioculari. Evitare le applicazioni prolungate, in particolare su ampie superfici.

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

INTERAZIONI

Nessuna nota.

AVVERTENZE SPECIALI

Se le condizioni peggiorano o se i sintomi persistono per più di 7 giorni, interrompere le applicazioni e consultare un medico. Non usare in bambini al di sotto dei due anni e in gravidanza, tranne che su consiglio e sotto controllo medico. Non usare nel trattamento del prurito vulvare, se associato a perdite vaginali.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE

Frizionando leggermente, spalmare la crema sulla parte malata in strato sottile, due volte al giorno. Non superare le dosi consigliate.

EFFETTI INDESIDERATI

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di irritazione o di sensibilizzazione. In tal caso è necessario interrompere il trattamento e consultare un medico al fine di istituire una terapia idonea.

E' in ogni caso opportuno segnalare al medico curante o al farmacista qualsiasi effetto indesiderato che si verificasse nel corso del trattamento.

DATA DI SCADENZA DEL MEDICINALE

Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Ricordare che la data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato a temperatura ambiente.

DATA ULTIMA REVISIONE DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO:

31 maggio 1995

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).