

(Foglio illustrativo)

**PRIMA DELL'USO**

**LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.**

**Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.**

- **per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista**
- **consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento**

**MORELAC**

10.000.000 UFC

5.000.000 UFC

4.000.000.000 UFC

**Polvere per sospensione orale**

**10 Bustine**

*Lactobacillus acidophilus* P-18806

*Lactobacillus delbrueckii* P-18805

*Streptococcus thermophilus* P-18807

**CHE COSA E'**

Microorganismi antidiarroici

**PERCHE' SI USA**

Sindromi dismicrobiche intestinali: sindromi diarroiche e dispeptiche da alterata flora batterica (diarrea, enteriti aspecifiche, coliti); dismicrobismo intestinale da antibiotici.

**QUANDO NON DEVE ESSERE USATO**

Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti, o alle sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

Ipersensibilità accertata ad uno dei costituenti del latte. (vedere anche il paragrafo "E' importante sapere che").

**PRECAUZIONI PER L'USO**

I batteri contenuti in MORELAC sono sensibili ai principali antibiotici. Per questo "MORELAC" deve essere assunto almeno tre ore dopo la somministrazione di antibiotici.

## **QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE**

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Non sono note interazioni medicamentose con altri farmaci.

## **È IMPORTANTE SAPERE CHE**

Morelac può essere utilizzato dagli individui intolleranti al lattosio mentre i pazienti con un' accertata allergia ad uno dei componenti del latte non dovrebbero utilizzare prodotti a base di batteri lattici.

In ragione della bassa quantità di lattosio contenuta nel prodotto e della sua associazione con batteri capaci di metabolizzarlo, l' utilizzo del prodotto da parte di individui intolleranti al lattosio, non dovrebbe comportare la comparsa di sintomi legati all' intolleranza al lattosio.

## **Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento**

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Non esistono particolari limitazioni all' uso di MORELAC durante la gravidanza e l' allattamento.

## **Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari**

“MORELAC” non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

## **Informazioni importanti su alcuni eccipienti**

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

## **COME USARE QUESTO MEDICINALE**

### **Quanto**

*Adulti:* 1 - 2 bustine al dì.

Attenzione: non superare le dosi indicate.

Non ci sono dati disponibili sui bambini.

### **Quando e per quanto tempo**

Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se si nota un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento..

### **Come**

Le bustine possono essere somministrate con un poco d' acqua oppure il loro contenuto può essere versato in una piccola quantità di acqua zuccherata o latte.

## **Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale**

Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio del prodotto.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di “MORELAC” avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

## **EFFETTI INDESIDERATI**

Come tutti i medicinali, MORELAC può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Non sono riportati in letteratura segnalazioni di effetti indesiderati.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio rivolgersi al medico o al farmacista. Gli effetti indesiderati possono, inoltre, essere segnalati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili) La segnalazione degli effetti indesiderati contribuisce a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale..

### **Come conservare MORELAC**

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull'etichetta dopo Scad:. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non usi questo medicinale se nota segni visibili di deterioramento.

Conservazione: conservare il prodotto a temperatura compresa tra + 2 °C e + 8 °C.

L'occasionale e breve permanenza a temperatura ambiente non compromette in modo significativo l'attività del prodotto.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### **Contenuto della confezione e altre informazioni**

#### **Cosa contiene MORELAC**

#### **Ogni bustina contiene:**

##### Principio attivo:

*Lactobacillus acidophilus* P-18806                      almeno 1 x 10<sup>7</sup> UFC/bustina

*Lactobacillus delbrueckii* P-18805                    almeno 5 x 10<sup>6</sup> UFC/bustina

*Streptococcus thermophilus* P-18807            almeno 4 x 10<sup>9</sup> UFC/bustina

##### Eccipienti:

Acido silicico - Sodio saccarinato - Aroma banana polvere - Aroma albicocca polvere – Maltodestrine – Crioprotettore (Latte scremato – Saccarosio – Sorbitolo – Sodio ascorbato – Tween 80) – Lattosio non più di 270 mg.

### **Descrizione dell'aspetto di MORELAC e contenuto della confezione**

Polvere per sospensione orale; confezione da 10 bustine.

### **TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

AKKADEAS PHARMA S.r.l. - Via Stephenson 43/A, 20157 Milano

**PRODUTTORE S.I.I.T.** - Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti - Via Ariosto 50/60 -  
Trezzano Sul Naviglio (MI)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il <{MM/AAAA}> <{mese AAAA}**

Agenzia Italiana del Farmaco