

## **Foglio illustrativo: informazioni per il paziente**

### **Muscoril contratture e dolore 2,5 mg/g crema** Ticolchicoside

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico, o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di tempo.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Muscoril contratture e dolore e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Muscoril contratture e dolore
3. Come usare Muscoril contratture e dolore
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Muscoril contratture e dolore
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è Muscoril contratture e dolore e a cosa serve**

Muscoril contratture e dolore contiene il principio attivo tiocolchicoside, che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati miorilassanti che agiscono rilassando i muscoli e alleviando il dolore.

Questo medicinale è utilizzato per il trattamento di:

- dolore alla schiena che può estendersi fino alle gambe e ai piedi, transitorio (lombo-sciatalgie acute);
- dolore al collo che può estendersi alle braccia e alle mani e può essere accompagnato da formicolio e difficoltà dei movimenti (nevralgie cervico-brachiali);
- dolore persistente al collo con limitazione o impossibilità di movimento (torcicolli ostinati);
- dolore post-traumatico e post-operatorio.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di tempo.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare Muscoril contratture e dolore**

##### **Non usi Muscoril contratture e dolore**

- se è allergico al tiocolchicoside o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se soffre di una condizione in cui viene persa la motilità volontaria dei muscoli (paralisi flaccida);
- se soffre di un indebolimento dei muscoli (ipotonie muscolari);
- se è in stato di gravidanza
- se sta allattando al seno se non dopo una attenta valutazione da parte del medico (Vedere paragrafo 2 "Gravidanza e allattamento").

### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Muscoril contratture e dolore.

L'uso di questo medicinale, specie se per trattamenti prolungati, può causare disturbi alla pelle come irritazione (fenomeni di sensibilizzazione). In questo caso interrompa il trattamento con Muscoril contratture e dolore. Il medico valuterà se è necessario cominciare una terapia idonea.

### **Altri medicinali e Muscoril contratture e dolore**

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono note forme di interazione con altri medicinali.

### **Gravidanza**

Non usi questo medicinale se è in gravidanza.

### **Allattamento**

Non usi questo medicinale se sta allattando al seno. Si rivolga al medico che valuterà se interrompere l'allattamento o il trattamento con questo medicinale, valutando i rischi per il bambino in rapporto al beneficio per la madre.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

L'uso di questo medicinale in rari casi può causare sonnolenza, tenga conto di questa possibilità se deve guidare veicoli o utilizzare macchinari.

### **Muscoril contratture e dolore 0,25% crema contiene paraidrossibenzoati**

Questo medicinale contiene paraidrossibenzoati che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate), come dermatiti da contatto, raramente di tipo immediato, accompagnate da orticaria e costrizione dei bronchi (broncospasmo).

## **3. Come usare Muscoril contratture e dolore**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 2-3 applicazioni al giorno. Applichi una quantità di prodotto in base alle dimensioni della zona interessata. Il medico valuterà la riduzione della dose in caso di comparsa di effetti indesiderati.

### **Se usa più Muscoril contratture e dolore di quanto deve**

Non sono noti casi di sovradosaggio in seguito all'uso di questo medicinale per uso locale.

### **Se dimentica di usare Muscoril contratture e dolore**

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

**Rari** (possono interessare fino a 1 su 1000 persone)

Reazioni allergiche cutanee che possono presentarsi come gonfiore intorno alla bocca, agli occhi e in altre zone (angioedema).

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare Muscoril contratture e dolore**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad".

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Muscoril contratture e dolore 2,5mg/g crema**

- Il principio attivo è tiocolchicoside. 100 g di crema contengono 250 mg di tiocolchicoside.
- Gli altri componenti sono polisorbato 80, sodio laurilsolfato, cetile palmitato, miscela di alcoli grassi e idrocarburi, lanolina idrogenata, acido stearico, sodio alginato, metil para-idrossibenzoato, etil para-idrossibenzoato, propil para-idrossibenzoato, lavanda essenza, acqua depurata.

### **Descrizione dell'aspetto di Muscoril contratture e dolore e contenuto della confezione**

Muscoril contratture e dolore 2,5 mg/g crema: tubo da 30 g.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

Sanofi S.p.A., - Viale L. Bodio, 37/B - Milano

### **Produttore**

Sanofi Winthrop Industrie - 196, Rue du Maréchal Juin 45200 - Amilly (Francia)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**