

PRIMA DELL'USO LEGGETE CON ATTENZIONE
TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO
Questo è un medicinale di automedicazione che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del Medico.
Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al Farmacista.
Consultate il Medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

RUSCOROID 25 mg + 25 mg supposte RUSCOROID 1% + 1% crema Ruscogenine + Tetracaina

Composizione

Supposte

Ogni supposta contiene: principi attivi: ruscogenine 25 mg; tetracaina cloridrato 25 mg.

Eccipienti: polisorbato 60, trigliceridi saturati a catena media, amido di mais, silice colloidale anidra, gliceridi semisintetici solidi.

Crema

100 g di crema contengono: principi attivi: ruscogenine 1g; tetracaina cloridrato 1g.

Eccipienti: alcool cetilico, polisorbato 80, Macrogol 400, Macrogol 4000, metile p-idrossibenzoato, etile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, profumo Rosemary 7144, acqua depurata.

Come si presenta

Ruscoroid si presenta come supposte per uso rettale o come crema per uso esterno.

Il contenuto della confezione di RUSCOROID supposte è di 10 unità.

Il contenuto della confezione di RUSCOROID crema è un tubo da 40 g.

Che cosa è

Vasoprotettori, antiemorroidali per uso topico, prodotti a base di anestetici locali: le ruscogenine hanno un'azione vasoprotettrice mentre la tetracaina è un anestetico.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

sanofi-aventis S.p.A: - Viale L. Bodio, 37/b – IT-20158 Milano

Produttore e controllore finale

Supposte:

Sanofi Winthrop Industrie - Quétingny (Francia)

Crema:

Sanofi Winthrop Industrie – Amilly (Francia)

Perché si usa

Trattamento dei sintomi associati ad emorroidi, ragadi anali e proctiti quali: prurito, dolore e senso di peso.

Quando non deve essere usato

Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

Quando può essere usato solo dopo avere consultato il Medico

- età inferiore a 12 anni (vedere "E' importante sapere che")
- gravidanza e allattamento (vedere "Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento")

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

In gravidanza e nell'allattamento RUSCOROID può essere usato solo dopo avere consultato il Medico ed avere valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.

Consultate il Medico nel caso sospettiate una gravidanza o desideriate pianificare una maternità.

Precauzioni per l'uso

L'impiego clinico non ha messo in evidenza la necessità di particolari precauzioni d'impiego.

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione con un peggioramento dei sintomi o la comparsa di arrossamenti cutanei e prurito generalizzati: ove ciò accada, occorre interrompere il trattamento e consultare il Medico per adottare idonee misure terapeutiche.

Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale

Non sono mai stati segnalati fenomeni riferibili ad interazioni con altre sostanze.

Comunque se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro Medico o Farmacista.

E' importante sapere che

L'uso, specie se prolungato, di prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione (irritazioni locali); in tal caso occorre interrompere il trattamento e consultare il Medico per le cure appropriate.

Non utilizzare per trattamenti protratti. Dopo un breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili ed in caso di uso prolungato consultare il Medico.

Non è raccomandato l'impiego al di sotto dei 12 anni di età, se non sotto diretto controllo del Medico.

In caso di pazienti con età inferiore a 12 anni occorre rivolgersi al Medico.

Come usare questo medicinale

• Quanto

Adulti

Supposte: 1-2 supposte al giorno.

Crema: 1-2 applicazioni al giorno

Età inferiore a 12 anni: esclusivamente secondo prescrizione medica.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del Medico.

• Quando e per quanto tempo

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

Consultate il Medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

• Come

Supposte: introdurre delicatamente la supposta nel retto.

Crema: applicare direttamente o mediante l'apposito applicatore che si avvita sul tubo.

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale

Non sono noti casi di sovradosaggio.

In caso di ingestione/assunzione di una dose eccessiva di RUSCOROID avvertite immediatamente il Medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

Effetti indesiderati

Rari casi di sensibilizzazione, quali eritemi locali e generalizzati associati a prurito.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti

indesiderati.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il Medico o il Farmacista.

E' importante comunicare al Medico o al Farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli effetti indesiderati disponibile in farmacia (modello B)

Scadenza e conservazione

RUSCOROID supposte: conservare a temperatura non superiore a 30°C.

RUSCOROID crema: conservare a temperatura non superiore a 25°C.

il periodo di validità dopo prima apertura è di 6 mesi

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco:

Giugno 2012

Agenzia Italiana del Farmaco