

# Arnica compositum

Veterinario

## Medicinale omeopatico per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate

Soluzione sterile

### 1. Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4  
DE-76532 Baden-Baden, Germania

#### Concessionario di vendita:

Guna S.p.a., Via Palmanova 71, 20132 Milano, Italia

### 2. Denominazione del medicinale veterinario

#### Arnica compositum Veterinario

Medicinale omeopatico per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate.

Scatola da 5 fiale da 5 ml

Scatola da 50 fiale da 5 ml

### 3. Indicazione dei principi attivi e degli altri ingredienti

**Una fiala da 5 ml contiene:** Achillea millefolium D3 5,00 mg; Matricaria recutita D3 5,00 mg; Symphytum officinale D6 5,00 mg; Aconitum napellus D2 3,00 mg; Atropa bella-donna D2 5,00 mg; Bellis perennis D2 2,50 mg; Calendula officinalis D2 5,00 mg; Echinacea D2 1,25 mg; Echinacea purpurea D2 1,25 mg; Hypericum perforatum D2 1,50 mg; Hepar sulfuris D6 5,00 mg; Mercurius solubilis Hahnemanni D6 2,50 mg; Hamamelis virginiana D1 0,50 mg; Arnica montana D2 5,00 mg.

### 4. Indicazioni

Non pertinente.

### 5. Controindicazioni

Non usare in animali con ipersensibilità nota alle sostanze attive o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

### 6. Reazioni avverse

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

### 7. Specie di destinazione

Bovini, caprini, equidi, ovini, suini, specie avicole, specie cunicole, specie ittiche, cani, gatti, uccelli ornamentali, roditori piccoli.


### 8. Posologia per ciascuna specie, vie e modalità di somministrazione

Via di somministrazione: intramuscolare, endovenosa, sottocutanea, intraarticolare, periarticolare e orale

#### Posologia:

Equidi, bovini, suini:	5 ml al giorno.
Suinetti:	2-3 ml al giorno.
Ovini, caprini:	2 ml al giorno.
Cani di grossa taglia:	3-4 ml al giorno.
Cani di media taglia:	2 ml al giorno.
Cani di piccola taglia, gatti:	1-2 ml al giorno.
Cuccioli di cane e gatto, specie cunicole:	0,5-1 ml al giorno.
Specie avicole:	1 ml al giorno (in 10 ml di acqua potabile).
Roditori piccoli, uccelli ornamentali:	0,5 ml al giorno.

-Heel Vet



Specie ittiche: in piscicoltura a gran scala, 1 ml per 10 kg (peso di pesce); in caso di attività zootecnica a piccola scala: 10 ml per acquario da 100 litri.

Se i sintomi persistono consultare nuovamente il medico veterinario.

---

## 9. Avvertenze per una corretta somministrazione

Osservare le corrette misure igieniche per la somministrazione del medicinale. Usare aghi e siringhe sterili.

---

## 10. Tempo di attesa

Zero giorni.

---

## 11. Particolari precauzioni per la conservazione

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Tenere le fiale nel loro imballaggio per proteggerle dalla luce solare diretta. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza riportata in etichetta. Periodo di validità dopo la prima apertura: usare immediatamente e non conservare.

---

## 12. Avvertenze speciali

### Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

La somministrazione del medicinale per via intraarticolare o periartricolare deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario. Se i sintomi persistono consultare nuovamente il medico veterinario.

### Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Osservare le corrette misure igieniche per la somministrazione del medicinale. Usare aghi e siringhe sterili.

### Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Le persone con nota ipersensibilità ai componenti devono somministrare il prodotto con cautela.

## Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione si raccomanda di somministrare medicinali omeopatici solamente sotto il diretto controllo del medico veterinario.

## Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Non sono note reazioni di interazione, in ogni caso non somministrare contemporaneamente ad altri medicinali.

## Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti)

Non pertinente.

## Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità non miscelare con altri medicinali.

---

## 13. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

---

## 14. Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo

12/2014

---

## 15. Altre informazioni

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

