

Zeel[®]
Veterinario

Medicinale omeopatico per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate

Soluzione sterile

1. Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden, Germania

Concessionario di vendita:

Guna S.p.a., Via Palmanova 71, 20132 Milano, Italia

2. Denominazione del medicinale veterinario

Zeel[®] Veterinario

Medicinale omeopatico per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate.

Scatola da 5 fiale da 5 ml

Scatola da 50 fiale da 5 ml

3. Indicazione dei principi attivi e degli altri ingredienti

Una fiala da 5 ml contiene: Arnica montana D3 50,0 mg; Cartilago suis D6 5,0 mg; Coenzym A D8 5,0 mg; Embryo totalis suis D6 5,0 mg; Funiculus umbilicalis suis D6 5,0 mg; Nadidum D8 5,0 mg; Placenta totalis suis D6 5,0 mg; Sanguinaria canadensis D4 7,5 mg; Solanum dulcamara D3 25,0 mg; Sulfur D6 9,0 mg; Symphytum officinale D6 25,0 mg; Acidum thiocticum D8 5,0 mg; Natrium diethyloxalaceticum D8 5,0 mg; Rhus toxicodendron D2 25,0 mg.

4. Indicazioni

Non pertinente.

5. Controindicazioni

Non usare in animali con ipersensibilità nota alle sostanze attive o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

6. Reazioni avverse

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

7. Specie di destinazione

Bovini, caprini, equidi, ovini, suini, specie avicole, specie cunicole, specie ittiche, cani, gatti, uccelli ornamentali, roditori piccoli.


8. Posologia per ciascuna specie, vie e modalità di somministrazione

Via di somministrazione: intramuscolare, sottocutanea, endovenosa, intraarticolare, periarticolare, orale

Posologia:

Equidi, bovini, suini:	5 ml al giorno.
Suinetti:	2-3 ml al giorno.
Ovini, caprini:	2 ml al giorno.
Cani di grossa taglia:	3-4 ml al giorno.
Cani di media taglia:	2 ml al giorno.
Cani di piccola taglia, gatti:	1-2 ml al giorno.
Cuccioli di cane e di gatto, specie cunicole:	0,5-1 ml al giorno.
Specie avicole:	1 ml al giorno (in 10 ml di acqua potabile).
Roditori piccoli, uccelli ornamentali:	0,5 ml al giorno.

-Heel Vet



Specie ittiche: in piscicoltura a gran scala, 1 ml per 10 kg (peso di pesce); in caso di attività zootecnica a piccola scala: 10 ml per acquario da 100 litri.



Se i sintomi persistono consultare nuovamente il medico veterinario.

9. Avvertenze per una corretta somministrazione

Osservare le corrette misure igieniche per la somministrazione del medicinale. Usare aghi e siringhe sterili.

10. Tempo di attesa

Zero giorni.

11. Particolari precauzioni per la conservazione

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Tenere le fiale nel loro imballaggio per proteggerle dalla luce solare diretta. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza riportata in etichetta. Periodo di validità dopo la prima apertura: usare immediatamente e non conservare.

12. Avvertenze speciali

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

La somministrazione del medicinale per via intraarticolare o periarticolare deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario. Se i sintomi persistono consultare nuovamente il medico veterinario.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Osservare le corrette misure igieniche per la somministrazione del medicinale. Usare aghi e siringhe sterili.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Le persone con nota ipersensibilità ai componenti devono somministrare il prodotto con cautela.

Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione si raccomanda di somministrare medicinali omeopatici solamente sotto il diretto controllo del medico veterinario.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Non sono note reazioni di interazione, in ogni caso non somministrare contemporaneamente ad altri medicinali.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti)

Non pertinente.

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità non miscelare con altri medicinali.

13. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

14. Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo

12/2014

15. Altre informazioni

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

